

8. Anjiyografi işlemleri riskleri nelerdir?

İşlemlerin gerçekleştirildiği organ ve hastanın genel durumuna göre değişmekle birlikte en sık karşılaşılanlar işlemde kullandığımız kontrast maddeye ve anestezi maddelere alerji ve işlem bölgesinde karşılaşılan kanamadır. Kullanılan kontrast madde miktarı modern anjiyografi cihazlarıyla en aza indirgenmiştir. Alerji olup olmadığı işlem öncesi sorgulanmaktadır ancak kullanılan ilaçlara oran çok düşük olmakla birlikte bazı durumlarda ilk kez ve şiddetli alerji oluşabilir. Böyle bir durumda hastaya gerekli müdahaleyi gerçekleştirebilecek ekipmanlar anjiyografi bölümünde hazır bulundurulur ve hastanemizin mavi kod uygulaması ile resüsitasyon ekibimizden destek alınmaktadır. Kanama için önceden kan testleri yapılır. Anormallik varsa işlem şartları normale dönene kadar ertelenir veya hiç yapılmaz. Mutlaka yapılması gerekiyorsa gerekli tedbirler alınarak işleme başlanır. İşlem sonrasında kanama ihtimaline karşı hastalar belirli süre gözlem altında tutulur.

8. What are the risks of the procedure?

Risk factors may vary by organs and general condition of the patients. The most frequently encountered risk factor is an allergic reaction to the contrast matter, anesthesia medicine and bleeding. The use of anesthesia medicine is reduced to minimum by the device. Although the patients are asked whether they are allergic to any kind of medicine or not and for some medications the risk of allergic reaction is very low, in some cases an allergic reaction may occur severely for the first time. In such a case, the necessary equipment is kept available in the angiography unit and there is a support group with the blue code application at our hospital and resuscitation team. Patients are pretested for bleeding. If there is an anomaly, procedure is delayed or canceled until patient turns to a stable stage. Only in an emergency case, procedure is performed under the precautions. After the procedure, patients are kept under observation for a while in case of bleeding.

8- ما هي مخاطر إجراء تصوير الأوعية الدموية؟

على الرغم من أنها تختلف باختلاف العضو الذي تُجرى فيه الإجراءات والحالة العامة للمريض ، إلا أن أكثرها شيوعاً هي الحساسية من المادة الظليلة والمواد المخدرة المستخدمة في الإجراء والنزيف في منطقة الإجراء. يتم تقليل كمية المادة الظليلة المستخدمة إلى الحد الأدنى مع أجهزة تصوير الأوعية الحديثة. يتم التساؤل عما إذا كانت هناك حساسية أم لا قبل الإجراء ، ولكن الرغم من أن المادة الظليلة المستخدمة منخفضة جداً للحساسية في بعض الحالات قد تحدث حساسية شديدة لأول مرة. في مثل هذه الحالة يتم الاحتفاظ بالمعدات التي يمكنها إجراء التدخل اللازم للمريض في قسم تصوير الأوعية الدموية ويتم تلقي الدعم من فريق الإنعاش لدينا من خلال تطبيق الكود الأزرق الخاص بمستشفانا. تُجرى اختبارات الدم مسبقاً للكشف عن النزيف. في حالة وجود خلل ما ، تتأخر العملية أو لا يتم إجراؤها حتى تعود الظروف إلى طبيعتها. إذا كان ذلك ضرورياً للعلاج ، تبدأ العملية من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يتم إبقاء المرضى تحت المراقبة لفترة زمنية معينة في حالة حدوث نزيف بعد العملية.