

9. Anjiyografi işleminin sonrası neler yapmalıyım?

Anjiyo işlemleri sonrası ayaktan tedavi hastalarımız ünitemizde, yatan hastalarımız ilgili servislerinde gözlem altında tutulmaktadır. Durumuna göre riski ortadan kalkan veya çok düşük olan hastaların taburcu işlemleri yapılmaktadır. Hastalarımız bilgilendirilerek taburcu sonrası en az 12 saat yatak istirahati yapması yönünde uyarılmaktadır. İşlem sonrası bölgede hafif şişlik ya da ağrı olabilir. Hastalarımız ağrı kesiciye ihtiyaç duydukları zaman mutlaka doktorunun kontrolünde kullanılmalıdır. Kanama durumlarında bölgeye kuvvetlice bastırmak kanamayı durdurabilir ancak en yakın acil servise hızlıca başvurmanız gerekmektedir. Bir(1) hafta boyunca ağır işlerden ve spordan uzak durulmalıdır. İşlem bölgesinde herhangi bir kızarıklık, sıcaklık artışı gibi enfeksiyon şüphesi olması durumunda hastanemiz Anjiyografi ünitesine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilendirme için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

9. What should I do after the procedure?

After angiography examination, outpatients are kept at the unit, hospitalized patients are under observation at the related services. According to his/her health condition, patients with low or none risk are discharged. After discharging, 12 hours bed rest is recommended. There might be a slight bump or pain on the region examined. If you need any painkiller, you should consult with your doctor first. In case of bleeding, you should strongly press on the region and you need to go to the nearest emergency room right away. You should stay away heavy duty and sport activity for 1 week. In case of any rash, feverness on the region, you should come to Angio unit at our hospital. You can click on the link for detailed information.

9- ماذا علي أن أفعل بعد إجراء تصوير الأوعية الدموية؟

بعد إجراءات تصوير الأوعية الدموية ، يتم إبقاء مرضانا الخارجيين تحت المراقبة في وحدتنا ، ويتم إبقاء المرضى الداخليين حتى زوال أو انخفاض الخطر على المرضى. يتم إبلاغ مرضانا وتحذيرهم لأخذ قسط من الراحة في الفراش لمدة 12 ساعة على الأقل بعد الخروج من المستشفى. بعد الإجراءات قد يكون هناك تورم ضعيف أو ألم في المنطقة مع الوقت إذا احتاج المريض إلى مسكنات الألم يجب أن يستخدم تحت مراقبة الطبيب. يجب عليهم بالتأكيد استخدامها تحت مراقبة الطبيب.

في حالة النزيف يمكن الضغط على المنطقة لوقف النزيف ولكن يجب أن تذهب بسرعة إلى أقرب خدمة طوارئ . يجب تجنب الأعمال الشاقة والرياضات لمدة أسبوع واحد (1).

إذا كان هناك إحمرار أو زيادة في درجة الحرارة في منطقة المعالجة أو الاشتباه في وجود التهاب (عدوى) يجب مراجعة وحدة تصوير الأوعية في المشفى