



SOLÜSYONLAR VE MULTİDOZ İLAÇLAR KULLANIM SÜRELERİ PLANI

Hazırlayan	Kontrol eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

İlaç/Solüsyon Adı	Kullanım Süresi	Kullanılan Etiket
Alkol, Aseton, Eter	Orijinal kabında saklanması son kullanma tarihine kadar, kullanılması ise kap üzerinde belirtilen açıldıktan sonra tüketim süresi talimatına göre, başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	Solüsyon Etiketi
Betadin, Biokadin ve Povidon Iyot	Orijinal kabında saklanması son kullanma tarihine kadar, kullanılması ise kap üzerinde belirtilen açıldıktan sonra tüketim süresi talimatına göre, başka kaba aktarıldığında 1 hafta süresince kullanılır.	
Formol	Son kullanma tarihine kadar kullanılır.	
Temizlik Kimyasalları	Kullanım kılavuzundaki süreler geçerlidir.	
Sıvı Sabunlar	Sıvı sabun kaplarının tam boşalması beklenir, tam boşaldığında yıkanıp durulanır, kurulanır ve sonra sabun konulur. (Tek kullanımlık sıvı sabunlar hariç)	Gıda Maddeleri Etiketi
Ara Öğün	Kata çıktıktan sonra 24 saat içinde tüketilmeli	
Ensure, Glucerna.. vb	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	
Mama Torbaları/Setleri	24 saat sonra değiştirilmelidir	
Serum Setleri Kateterler	72 saatte bir değişir. Ancak kan ve kan ürünleri veya lipid emülsiyonlar uygulanmış ise bu süre 24 saattir.	Serum Seti/Humudifer Etiketi
Gavaj Enjektörü	24 saat süresince kullanılır.	
Humudifer	24 saat süresince kullanılır	
Distile Su	Açıldıktan sonra 24 saat süresince kullanılır	
Flakonlar	Stabil kalıyorsa açıldıktan sonra en fazla 24 saat uygun sıcaklıkta aseptik şartlarda saklanmışsa kullanılır.	Açılan İlaç Etiketi
Göz ve Kulak Damlaları	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	
İnsülin	Açıldıktan sonra 28 gün ve prospektüs saklama kuralına uygun sıcaklıkta aseptik şartlarda saklanmışsa kullanılır.	
Pomadlar	Açıldıktan sonra prospektüs bilgisine göre kullanılır.	
Şuruplar	Prospektüs bilgisi dahilinde kullanılır.	
Vazelin	Orijinal kabında son kullanma tarihine kadar, açıldıktan sonra her hasta için özel olarak hazırlanır 24 saat süresince oda sıcaklığında saklanır	



SOLÜSYONLAR VE MULTİDOZ İLAÇLAR KULLANIM SÜRELERİ PLANI

İnfüzyon Olarak Verilen İlaçlar	İnsülin içerikli olanlar 4 saatte bir değiştirilir. Hazırlanan ilaç infüzyonları prospektus bilgisine göre kullanılır. Bazı özel ilaçlar, prospektus bilgisine göre değiştirilir. (örn. Nipruss)	İnfüzyon Etiketi
Majistral İlaçlar	Eczacı tarafından belirlenen süre içinde kullanılır.	Majistral İlaç Etiketi

ÖRNEKTİR BASILAMAZ